

密室逃脫

青春「毒」白

教學者 陳柏宇

規則

- 小組競賽-每個關卡第一者得3分，第二者得2分，第三者得1分
- 救援卡未用掉每個得5分
- 每個關卡限定時間8min完成，無法完成可以使用救援卡獲得提示
- 完成後依成績領取獎勵
- 最後一點，Have fun!

賭注背後
的祕密
血汗的代
價



For我的好友

我所知道的丫丫，因為升上國一，因為國中的內容比國小艱深，段考前都十分焦慮擔心讀不完應試的範圍所以常熬夜苦讀，無奈成績始終不太理想，可是最近我發現他最近似乎變了，熬夜對他來說，不再是困擾，整個人情緒十分HIGH，活蹦亂跳似乎變了個人，

想知道脫離吊車尾的祕密嗎？

一段時間後又變得十分沮喪，我覺得這件事不單純，有必要研究一番，如果你身旁也有類似的同學，可能要特別留意，我要發揮柯南的冒險精神，揭發他的祕密，打開他的筆記本，上面寫著0603這個日子，似乎藏有祕密～開始吧！





o6o3的秘密

o6o3是個值得紀念的日子，但當時也興起了如風暴般的轉變，到底這天是哪位歷史人物的宣示舉動震撼了中外呢？

猜一位
歷史人物

恭喜你得到了指引，也因此發現丫丫書包裡的秘密袋子，上面寫著武林秘技，裡面藏有什麼呢？好像發現了什麼？！



武

上述歷史上的這
天所銷毀物品與
右圖植物有淵源。
我記得歷史老師
說過右圖的這朵
「死亡之花」跟
晚清的滅亡有關！
你能揭露它的名
稱嗎？

猜一植物名



原作真跡

資料來源:https://ss.net.tw/paint-151_113-7502.html

林

你能夠解讀歷史的典故，證明你也是個有心想知道真相的人，但我必須清楚你的心意與能耐，我才放心把我知道的一切告訴你，嘗試破解看看右邊的謎題吧！

姜太公釣魚

射二字數學名詞

射三字毒品
名詞

預祝早日復原

射三字數學
名詞

考試不作弊

射三字毒品

殺人致死

提示：_他_

射五字數學
名詞

斤 文 斤 貝
口 大 婁

射五字數學名詞

秘

沈甸甸的，裡面裝著是什麼啊！倒出來看看，難怪最近這麼愛吃糖果，這些糖果好像長得不太一樣




四位數字的密碼，趕快把它解出來吧！
然後打開寶箱
拿到“技”



找出四張可能偽裝成毒品的食品圖卡，然後要把這四張圖卡背後的點數，利用加減乘除的運算，得到 **12** 這個結果

$$\square \left(\square \div \square - \square \right) = 12$$

技

請將色卡們拼成長方形，上藏有
中文字，對照中
文字所屬的級別
由左至右得到四
個數字





毒品分級表- 中樞神經抑制劑

中樞神經抑制劑 麻醉藥品類

濫用藥物 / 俗名	分級	醫療用途	濫用方式	濫用危害
鴉片 Opium 福壽膏 芙蓉膏	I	鎮痛 止瀉	經口 吸食	1. 嗜睡、惡心、嘔吐、呼吸抑制、便秘、尿滯留、瞳孔縮小。 2. 海洛因主要濫用方式為靜脈注射，常因針頭不潔造成感染，共用針頭更可造成愛滋病、病毒性肝炎、梅毒等血液傳染疾病。具有極強生理及心理成癮性。
嗎啡 Morphine 魔啡	I	鎮痛	注射 口服	打呵欠、盜汗、流眼淚、流鼻水、皮膚起疙瘩、失眠、焦慮不安、易怒、發抖、嘔吐、腰痛、肌肉痙攣、皮膚蟲蟻感。
海洛因 Heroin 白粉 四號 細仔	I	無	注射 吸食	
潘他唑新 Pentazocine 速賜康 孫悟空 猴仔	II	鎮痛	注射 口服	

戒斷症狀

打呵欠、盜汗、流眼淚、流鼻水、皮膚起疙瘩、失眠、焦慮不安、易怒、發抖、嘔吐、腰痛、肌肉痙攣、皮膚蟲蟻感。

中樞神經抑制劑 (戒斷藥品類)



濫用藥物 / 俗名	分級	醫療用途	濫用方式	濫用危害
美沙冬 Methadone	II	鎮痛 戒癮治療	注射 口服	1. 嗜睡、惡心、嘔吐、呼吸抑制、便秘、尿滯留、瞳孔縮小。 2. 海洛因主要濫用方式為靜脈注射，常因針頭不潔造成感染，共用針頭更可造成愛滋病、病毒性肝炎、梅毒等血液傳染疾病。具有極強生理及心理成癮性。
配西汀 Pethidine	II	鎮痛	注射	打呵欠、盜汗、流眼淚、流鼻水、皮膚起疙瘩、失眠、焦慮不安、易怒、發抖、嘔吐、腰痛、肌肉痙攣、皮膚蟲蟻感。
可待因 Codeine	II~IV	鎮痛 止咳	注射 口服	
丁基原啡因 Buprenorphine	III	鎮痛 戒癮治療	注射 口服 舌下	
特拉嗎竇 Tramadol	IV	鎮痛	注射 口服	

戒斷症狀

打呵欠、盜汗、流眼淚、流鼻水、皮膚起疙瘩、失眠、焦慮不安、易怒、發抖、嘔吐、腰痛、肌肉痙攣、皮膚蟲蟻感。

毒品分級表- 中樞神經抑制劑

中樞神經抑制劑 鎮靜安眠劑

巴比妥酸鹽類 Barbiturates

濫用藥物 / 俗名	分級	醫療用途	濫用方式	濫用危害
西可巴比妥 Secobarbital (Seconal) 紅中	III	鎮靜 安眠	注射 口服	意識障礙、運動失調、 暈眩、嗜睡、視覺障 礙、迷糊、健忘、注意 力不集中、記憶力受 損、呼吸抑制。 戒斷症狀 頭痛、噁心、嘔吐、虛 弱、焦慮不安、易怒、失 眠、盜汗、顫抖、痙攣。

異戊巴比妥 Amobarbital (Amytal) 青發	III	鎮靜 安眠	注射 吸食	
--	-----	----------	----------	--

其他

甲喹酮 Methaqualone (Norminox) 白板	II	無	注射 口服	
---	----	---	----------	--

中樞神經抑制劑 (鎮靜安眠劑)

苯二氈平類 Benzodiazepines

濫用藥物 / 俗名	分級	醫療用途	濫用方式	濫用危害
氟硝西泮 Flunitrazepam (Rohypnol) 十字架 FM2	III	鎮靜 安眠	口服 注射	嗜睡、精神恍惚、運動 失調、頭痛、噁心、焦 躁不安、健忘、記憶力 不集中、意識不清。 戒斷症狀 焦慮、失眠、憂鬱、顫 抖、暈眩、妄想、痙攣。

硝甲西泮 Nimetazepam (Erimin) 一粒眠 紅豆	III	鎮靜 安眠	口服	
--	-----	----------	----	--

三氫二氮平 Alprazolam (Xanax) 蝴蝶片	IV	鎮靜 安眠	口服	
---------------------------------------	----	----------	----	--

二氮平 Diazepam (Valium) 安定 煩寧	IV	鎮靜 安眠	口服 注射	
---	----	----------	----------	--

三唑他 Triazolam (Halcion) 小白板	III	鎮靜 安眠	口服	
--------------------------------------	-----	----------	----	--

中樞神經抑制劑 (鎮靜安眠劑)

濫用藥物 / 俗名	分級	醫療用途	濫用方式	濫用危害
有機溶劑 Organic solvent 強力膠 打火機油 油漆 汽油	未列	無	吸入	意識不清、幻覺、口齒 不清、厭食、沮喪、焦 躁不安、妄想、噁心、 嘔吐、呼吸抑制、心律 不整、猝死、重複發作 之流鼻血及口鼻潰瘍。

GHB 液態搖頭丸 Liquid Ecstasy Georgia Home Boy G	II	無	口服	噁心、嘔吐、呼吸困難、 頭痛、失去意識、昏迷 及死亡，與酒精併用會 加劇其危險性。 戒斷症狀 失眠、焦慮、顫抖及流汗。 在美國GHB與Ketamine和 FM2同列為約會強姦丸。
---	----	---	----	---

Ketamine 卡門 K他命 Special K K仔 Cat valium	III	手術 麻醉	口服 鼻吸 煙吸 注射	心搏過速、血壓上升、 噁心、嘔吐、流淚、複 視、視力模糊、影像扭 曲、頭暈、暫時性失憶 症、無法行走及急性精 神病。高劑量可造成呼 吸抑制致死。
--	-----	----------	----------------------	--

一氧化二氮 N ₂ O 笑氣 吹氣球	未列	手術 麻醉	鼻吸	幻覺、失憶、憂鬱、不 同程度缺氧、肺氣腫、 氣胸，血液、骨髓及周 邊神經病變。
--	----	----------	----	--

毒品分級表- 中樞神經興奮劑 中樞神經迷幻劑

中樞神經興奮劑

中樞神經興奮劑

常用藥物 / 俗名	分級	醫療用途	常用方式	常用危害
古柯鹼 Cocaine 可卡因 快克 crack snow	I	局部麻醉 止流鼻血	經口 鼻吸 煙吸	興奮、瞳孔擴散、失眠、躁動、沮喪、焦慮不安、食慾不振、噁心、嘔吐、妄想型精神病、心律不整、痙攣。 戒斷症狀 呆滯、嗜睡、焦慮、煩躁不安、憂鬱。
				
安非他命 Amphetamine 甲基安非他命 Methamphetamine 冰塊 冰糖 鹽 安公子 安仔 炮仔	II	無	經口 煙吸 注射	1. 精神方面不良作用：失眠、焦慮、躁躁易怒、情緒不穩、記憶減退、妄想、視幻覺、聽幻覺、譫妄、具攻擊性、自殺及殺人傾向、精神分裂症、神經系統傷害等。 2. 心血管不良作用：心跳加速、心悸、心律不整、高血壓、腦溢血。 3. 過量時：會造成昏迷、體溫過高、橫紋肌溶解及急性腎衰竭，甚至導致死亡。 戒斷症狀 沮喪、憂鬱、全身乏力、睡眠異常、焦慮易怒。
				
亞甲雙氧 methylenedioxy- methamphetamine 搖頭丸 狂喜 忘我 綠蝴蝶 MDMA	II	無	口服	瞳孔擴散、步態不穩、眼球震盪、激動、失憶、妄想、焦慮不安及幻覺，過量可造成精神病甚至死亡。 戒斷症狀 沮喪、憂鬱、全身乏力、睡眠異常、焦慮易怒。
				

中樞神經迷幻劑

常用藥物 / 俗名	分級	醫療用途	常用方式	常用危害
大麻 Cannabis Marijuana Hemp 草 蔴仔 老鼠尾	II	無	口服 煙吸	吸食後會產生心跳加速、妄想、幻覺、口乾、眼睛發紅等現象，長期使用會造成記憶、學習及認知能力減退、體重增加、免疫力降低、不孕症及動機缺乏症候群，孕婦吸食會造成流產或死產。 戒斷症狀 易怒不安、食慾減退、失眠、出汗、震顫、噁心、嘔吐。
				
麥角乙二胺 Lysergide (LSD) 搖頭丸 ELISA 加州陽光 白色閃光 Acid	II	無	口服 舌下	瞳孔擴散、欣快感、焦慮、頭痛、噁心、嘔吐、妄想、幻覺、恐慌、肌肉僵直及發抖，過量可造成精神病甚至死亡。
				
苯環利定 Phencyclidine (PCP) 天使塵 Love Boat	II	無	口服 煙吸	瞳孔擴散、步態不穩、眼球震盪、激動、失憶、妄想、焦慮不安及幻覺，過量可造成精神病甚至死亡。
				

中樞神經迷幻劑及其他

常用藥物 / 俗名	分級	醫療用途	常用方式	常用危害
Nitrites Amyl nitrite Isobutyl nitrite Poppers Rush Bolt	未列	心絞痛、緩解腎炎或膽囊炎引起之腹痛、氟化物中毒輔助治療劑。	舌下吸入 貼片	流行於男同性戀族群中，可造成面部及頸部潮紅、頭痛、姿態性低血壓、心悸、暈眩、虛弱、不安、冒冷汗、蒼白、大腦缺血、噁心、嘔吐、反彈性高血壓、昏倒、休克及致死性變性血紅素血症。 非醫療用途：空間芳香劑。
				
				

發現

1. 吸食安非他命者：失眠、亢奮、食慾差、體重減輕；猜忌多疑、有藥品異味及發現吸食瓶罐、鋁箔紙。
2. 吸食強力膠者：有如酒醉之動作；身上或房內有溶劑味；發現強力膠空罐、裝有強力膠之塑膠袋或指甲油等空瓶。
3. 吸食嗎啡或海洛因者：大量之金錢花費；有靜脈注射痕跡；瞳孔小如針尖，焦慮、打呵欠、流鼻水、流眼淚、噁心、嘔吐等現象。

仔細觀察身邊有沒有人有這些症狀



發現

4. 吸食Ketamine者：以口或鼻的方式服用，產生與現實環境分離的感覺，並會產生幻覺或類似瀕臨死亡經驗的作用。由於Ketamine會產生無助、對環境知覺喪失，並伴隨著嚴重的協調性喪失及對疼痛感知降低，此種情況往往讓服毒處於極度危險狀態。長期使用會產生耐藥性及心理依賴性，造成強迫性使用，停藥後雖不會產生戒斷症狀，但不易戒除。
5. 吸食毒咖啡：裡面的主要成分就是一些其他毒品，如搖頭丸、冰毒、K粉等。比如說：服用含有搖頭丸的「咖啡」，人體中樞神經系統、血液系統會極度興奮，出現搖頭不止、行為失控、思想偏執等症狀，並且會很快成癮。而服用含冰毒、K粉的「咖啡」，可想而知，也會出現與這些毒品對應的一些症狀。

原文網址：<https://kknews.cc/news/aek9zrj.html>

- 恭喜密室逃脫成功！
- 破解了丫丫的秘密

後記

- 後來，被同學發現之後，丫丫師長的協助下，離開毒品的使用，在沒有使用武林密技之後，一度異常疲倦，精神恍惚，成績嚴重下滑，經過了很長時間才逐漸恢復正常生活。
- 所以，遙想百多年前，林則徐是不是解救許多百姓的民族英雄啊！